

Prípravok nesmie byť použitý ináč, než ako je uvedené v návode na použitie.

### 2.3. Iná nebezpečnosť

**Prehľad:** Požierová nástraha vo forme červených pelet. Pri dodržaní návodu na použitie nehrozí riziko poškodenia zdravia. Zabráňte kontaminácii potravín, nápojov a vodných tokov. Uchovávajte mimo dosahu detí. Obaly od prípravku sa nesmú znova používať k akýmkoľvek účelom. Prípadné zvyšky prípravku a prázdne obaly zlikvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami.

#### Výsledky posúdenia PBT a vPvB:

PBT: neuvádza sa

vPvB: neuvádza sa

## 3 Zloženie/informácie o zložkách

Výrobok je zmes, obsahuje tieto nebezpečné látky:

<b>Bromadiolón</b>	<b>0,0005 % (0,05g/kg)</b>
<b>Chemický názov CAS:</b>	3-[3-(4'-bromo-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one
<b>Číslo CAS:</b>	28772-56-7
<b>Chemický názov IUPAC:</b>	-
<b>Názov ISO/názov EU:</b>	-
<b>Číslo ES (EINECS):</b>	249-205-9
<b>Index číslo EU:</b>	-
<b>Klasifikácia EU látky:</b>	<span style="color: red;">■</span> T+ R26/27/28 - <span style="color: red;">■</span> T R48/23/24/25 - <span style="color: red;">■</span> N R 50/53 <span style="color: red;">◆</span> akut. tox.1, H300, akut. tox.1, H310, , akut. tox.1, H330 <span style="color: red;">◆</span> tox. pre sp. cieľ. org. kat.1, H372, <span style="color: red;">◆</span> neb. pre vod. prostr.-akut. 1, H400, neb. pre vod. prostr.- chron. 1, H410
<b>Empirický vzorec:</b>	C <sub>30</sub> H <sub>23</sub> BrO <sub>4</sub>
<b>Molekulová hmotnosť:</b>	527,4

## 4 Opatrenie prvej pomoci

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci:

**Všeobecné pokyny:** Postupujte podľa nižšie uvedených inštrukcií.

**Po inhalácii:** Presunúť postihnutú osobu na čerstvý vzduch. Vyhľadať lekára.

**Po kontakte s pokožkou:** Dôkladne omyť vodou a mydlom. Pokiaľ pretrváva podráždenie, vyhľadať lekára.

**Po kontakte očami:** Po kontakte s očami ich okamžite vyplachovať čistou vodou počas 15-tich minút i pod viečkami. Vyhľadať lekára.

**Po požití:** Starostlivo vypláchnuť ústa vodou. Vyhľadať ihneď lekársku pomoc. Lekárovi odovzdať obal od prípravku, etiketu alebo kartu bezpečnostných údajov. Nevyvolávať zvracanie, ak je pacient v bezvedomí.

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne a oneskorené:

Inhibitor vitamínu K, vyvoláva krvácanie z nosu a ďasien, krvné výrony v podkoží a na slizniciach. Príznaky na ostatných orgánoch sú hlavne tiež krvácaniny. Môže byť pozorovaný šok aj celková slabosť.

### 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania:

**Doporučená terapia:** V prípade konzumácie väčšieho množstva produktu sa odporúča vyvolať zvracanie, výplach žalúdka a kontrola aktivity protrombinu. V prípade jej poklesu podanie vitamínu K. Antikoagulanty sú kontraindikované.